一株新型鸭肝炎病毒的分离与鉴定

陈生雷,李凤艳,郭华,边少国,项伟,舒秀伟,苗玉和

(辽宁益康生物股份有限公司,辽宁辽阳 111000)

[收稿日期] 2015-09-18 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2016) 01-0019-05 [中图分类号] S852.65

[摘要] 从辽宁省某鸭场疑似鸭病毒性肝炎病料中分离到一株病毒,经 PCR 检测初步鉴定其为鸭肝炎病毒,命名为 YK 株,应用易感鸭胚和雏鸭进行传代及病毒含量测定, $E_1 \sim E_5$ 代鸭胚适应毒病毒含量在 $10^{6.5} \sim 10^{6.9}$ ELD₅₀/0.2 mL 之间, E_2 代鸭肝组织毒病毒含量为 $10^{6.3}$ LD₅₀/0.1 mL。动物试验结果表明,YK 株鸭胚适应毒 E_2 代对 7 日龄雏鸭的致死率高达 100%。序列测定分析表明,YK 株与 DHV-A 的 VP1 基因同源性在 71.4%~72.3% 之间,与 DHV-B 的 VP1 基因同源性在 71.9%~72.3% 之间,与 DHV-C 的 VP1 基因同源性在 94.3%~98.8% 之间。试验表明,YK 株与韩国新型鸭肝炎病毒在同一分支上,属于基因 C 型 DHV。

[关键词] 鸭肝炎病毒;分离;鉴定

Isolation and Identification of a Duck Hepatitis Virus Strain

CHEN Sheng-lei, LI Feng-yan, GUO Hua, BIAN Shao-guo,

XIANG Wei, SHU Xiu-wei, MIAO Yu-he

(Liaoning Yikang Biological Co., Ltd, Liaoyang, Liaoning 111000, China)

Abstract: A virus strain was isolated from suspected duck viral disease from dead duck in Liaoning Province, and identified by reverse-transcriptase polymerase chain reaction. It is a duck hepatitis virus that named YK strain. The isolates were passed from E_1 to E_5 , the titer determination in duck embryos were from $10^{6.5}$ to $10^{6.9}$ ELD₅₀/0.2 mL; the titer determination in duckling hepatitis tissue titer was $10^{6.3}$ /0.1 mL at E_2 . Animal regression experimental results showed that The YK strain in duck embryos to 7-day-old duckling mortality was 100%. Sequence comparison with DHV-A serotype showed that the identity was 71.4%~72.3%, 71.9%~72.3% with DHV-B serotype and 94.3%~98.8% with DHV-C serotype. It proves that the YK strain and new serotype strain in Korea belongs to DHV-C serotype.

Key words: duck hepatitis virus; isolation; identification

鸭病毒性肝炎(duck viral hepatitis, DVH)是由鸭肝炎病毒(duck hepatitis virus, DHV)引起的一种传播迅速并高度致死雏鸭的病毒性传染病,以发病

急、传播快、病程短、死亡率高为主要特征,主要侵害 4 周龄以内雏鸭,1 周内最易感,死亡率可高达 90% 以上^[1-2]。研究表明,鸭肝炎病毒有三个血清

型,即 I 型(DHV-1)及其变异株(Ia 型)、II 型(DHV-2)和 III 型(DHV-3),DHV-2 和 DHV-3 又分别被称为台湾新型和韩国新型,三个血清型之间没有交叉保护和交叉中和作用。

为了更好地研究鸭病毒性肝炎的病原,根据 DHV 的基因进化规律又将其分为 A、B、C 型,分别对应原有的 DHV-1、台湾新型、韩国新型^[3-5]。新型的鸭肝炎病毒的出现给养鸭业带来了严重的经济损失。近年来,戴玉婷^[6]、孙林杰^[7]、张雪^[8]等相继报道了与 DHV-1 不同的新型鸭肝炎病毒。本试验对辽宁省疑似鸭病毒性肝炎病鸭进行了病原分离和鉴定,以期对鸭病毒性肝炎的防治提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料 DHV-1 型病毒 SDE 株及其阳性血清,由辽宁益康生物股份有限公司提供;疑似 DHV 病料来自辽宁省一鸭场的发病鸭。

1.2 实验动物 易感鸭胚及健康易感雏鸭,由辽宁益康生物股份有限公司提供,使用前检测抗体为阴性。

1.3 试剂 核酸提取试剂盒和 RT-PCR 一步法试剂盒,购自北京全式金生物科技有限公司。

1.4 病毒鉴定与增殖

1.4.1 RT-PCR 初步鉴定 根据 GenBank 中已公布的新颖鸭肝炎病毒全基因序列,设计引物,上游引物:5'-AGCACGAGAGACCCTTACG-3',下游引物:5'-CCCACAGGCTCTCACTAAAG-3',由宝生物工程(大连)有限公司合成。将采集的病料处理后,应用上述特异性引物按程序进行 RT-PCR 扩增,产物于 1% 琼脂糖凝胶电泳后观察,预计扩增片段长度为 770 bp。

1.4.2 在鸭胚上增殖 将无菌采集的病鸭肝脏在灭菌的研磨器内充分研磨,用灭菌生理盐水制成 1:5 乳剂,3000 r/min 离心 30 min,取上清液,加青、链霉素,使终浓度为 2000 IU/mL,4℃ 过夜。取 11 日龄易感鸭胚 20 枚,分为 2 组,第 1 组为试验组,经尿囊腔途径接种病料,0.2 mL/胚;第 2

组为对照组,经尿囊腔途径接种灭菌生理盐水,0.2 mL/胚。接种后继续孵化,每日照蛋 2 次,收获 24~144 h 死亡胚尿囊液,观察胚体及内脏病变,参照《中国兽药典》^[9] 经无菌、支原体及外源病毒检测合格后冻干保存、备用。按此方法连续传代。

1.4.3 在易感雏鸭上增殖 将 1.4.2 样品做 100 倍稀释后,经胸部肌肉注射 7 日龄雏鸭,0.1 mL/只。观察 7 日,无菌采集攻毒后死亡且具有典型病变的鸭肝脏,研磨后分装,-20℃ 保存。

1.4.4 对鸭胚的半数致死量测定 取分离株鸭胚尿囊液作 10 倍系列稀释,取适宜稀释度经尿囊腔接种 11 日龄易感鸭胚,每个稀释度接种 5 枚,0.2 mL/枚,37℃ 孵育,观察 7 日,记录鸭胚死亡情况,按 Reed-Muench 法计算鸭胚半数致死量(ELD₅₀)^[9]。

1.4.5 对易感雏鸭的半数致死量 将肝组织毒 E₂ 经 10 倍系列稀释,取适宜稀释度经胸部肌肉注射 7 日龄易感雏鸭,每个稀释度接种 6 只,0.1 mL/只,观察 10 日,计算雏鸭半数致死量(LD₅₀)^[9]。

1.4.6 动物致病性试验 取 7 日龄雏鸭 20 只,随机分为 2 组,第 1 组将收获的 E₂ 代鸭胚尿囊液作 10 倍稀释,经胸部肌肉接种雏鸭 10 只,0.2 mL/只;第 2 组将 0.85% 灭菌生理盐水经胸部肌肉接种雏鸭 10 只,0.2 mL/只,作为对照组。观察 10 日,记录发病死亡情况,死亡鸭解剖观察病理变化。

1.4.7 特异性血清中和试验 采用固定病毒稀释血清法进行测定,将鸭胚适应毒 E₂ 代和 SDE 株 E₂ 代病毒液稀释至病毒含量为 200 ELD₅₀/0.1 mL,取适宜稀释度 SDE 株阳性血清与等量的 200 ELD₅₀ 病毒液混合,37℃ 中和 1 h,0.2 mL/枚,同时设立血清对照和病毒对照组,5 枚/组,37℃ 孵育 7 日,记录各组死亡情况。

1.4.8 基因序列测定与分析 将 PCR 产物送至宝生物工程(大连)有限公司进行测序,并将结果用 DNASTar 软件进行序列分析,参考序列见表 1。

表1 参考序列

编号	毒株	GenBank 登录号	分离地	基因型
1	AP-03337	DQ256132	South Korea	DHV-C
2	AP-04009	DQ256133	South Korea	DHV-C
3	AP-04114	DQ812093	South Korea	DHV-C
4	AP-04203	DQ256134	South Korea	DHV-C
5	FS	EU877916	China	DHV-C
6	SD02	GQ485311.1	China	DHV-C
7	04G	EF067923	Taiwan	DHV-B
8	90D	EF067924	Taiwan	DHV-B
9	DRL-62	DQ219396	ATCC	DHV-A
10	R85952	DQ226541	ATCC	DHV-A
11	JX	EF093502	China	DHV-A
12	ZJ-A	EF442072	China	DHV-A
13	AV2111	EF442073	China	DHV-A

2 结果

2.1 分离鉴定结果 将临床疑似鸭肝炎病例的感染动物,采集肝组织,经研磨处理经 RT-PCR 初步鉴定为新型鸭肝炎病毒(图1),此病毒能在鸭胚上增殖,并能使7日龄易感雏鸭发病。

M:DL2000 Marker;1:YK 株鸭胚毒;
2:YK 株肝组织毒;3:SDE 株;4:阴性对照

图1 RT-PCR 结果

2.2 鸭胚传代及病毒含量测定 在11日龄鸭胚上连续传代至 E₅ 代,接种鸭胚后死亡时间主要集中在 96~120 h,死亡胚皮下出血、水肿,肝脏有明显的坏死灶或坏死点(图2),对照组鸭胚则全部存活。传至 E₃ 代后鸭胚死亡规律,毒价稳定,表明该分离株能很好的适应11日龄易感鸭胚。结果见表2。

表2 鸭胚传代死亡比例及病毒测定结果

检测项目	E ₁	E ₂	E ₃	E ₄	E ₅
病毒传代死亡比例	6/10	8/10	10/10	10/10	10/10
病毒含量/ (ELD ₅₀ · 0.2mL ⁻¹)	10 ^{6.5}	10 ^{6.9}	10 ^{6.7}	10 ^{6.5}	10 ^{6.7}

2.3 雏鸭半数致死量测定 将 YK 株 E₂ 代肝组织毒应用7日龄易感雏鸭进行半数致死量测定,易感雏鸭于攻毒后24 h开始死亡,死亡高峰集中在24~48 h,死亡雏鸭呈现典型的角弓反张状态,剖检肝脏有明显的点状出血。结果 YK 株 E₂ 代肝组织毒对雏鸭的半数致死量为 10^{6.3} LD₅₀/0.1 mL。

2.4 动物致病性试验 第1组试验鸭攻毒后24 h开始发病死亡,72 h全部死亡,死亡主要集中在攻毒后24~48 h,共死亡20只,致死率高达100%;临床症状为突然发病,精神萎靡,食欲废绝,发病片刻即倒地,先是两腿向上作游泳样划动,后头部向后仰,呈现角弓反张状。解剖死亡鸭,肝脏肿胀,呈土黄色,有明显的出血斑点,其他脏器无显著变化,剖检结果见图3。第3组对照鸭则全部健康存活。

2.5 血清中和试验 表3结果表明,YK 株不能被 I 型鸭肝炎病毒阳性血清中和,SDE 株能被 I 型鸭肝炎病毒阳性血清中和,说明 YK 株和 SDE 株为不同血清型。

图2 YK株接种后鸭胚及肝脏病变

图3 攻毒后死亡雏鸭及病变肝脏

表3 血清中和试验结果

毒株	鸭胚死亡比例		
	DHV-1 阳性血清	病毒对照	空白对照
YK 株	5/5	5/5	0/5
DHV-1 型 SDE 株	0/5	5/5	/

2.6 测序分析 应用设计引物,对 YK 株进行 RT-PCR 扩增并将产物进行测序,将测序结果与鸭肝炎病毒 VP1 基因序列进行比对,并构建进化树。结果显示, YK 株与 DHV-C 型基因同源性为

94.3%~99.0%,与台湾新型(04G 和 90D)基因同源性分别为 71.9% 和 72.3%,该分离株与 DHV-C 型属于同一基因型,且与 DHV-B 型相邻,但与 DHV-A 处于不同的分支。结果见图 4、图 5。

图4 YK株测序结果进化分析

		Percent Identity															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Divergence	1	■														YK	
	2	6.0	■	94.3	94.3	95.0	95.1	98.8	96.6	71.9	72.3	72.3	71.6	71.8	71.4	71.6	AP03337
	3	6.0	0.7	■	99.3	99.3	98.8	96.5	95.6	78.3	78.4	73.9	73.7	73.6	70.4	70.0	AP04009
	4	5.3	0.7	0.9	■	98.7	96.6	95.8	78.4	78.5	73.9	73.8	73.8	70.3	70.3	AP04114	
	5	5.1	1.2	1.4	1.3	■	96.5	95.7	78.3	78.4	73.8	73.8	73.7	71.0	71.1	AP04203	
	6	1.2	3.6	3.8	3.5	3.6	■	97.9	78.5	78.6	73.9	73.9	73.8	71.4	72.0	FS	
	7	3.5	4.6	4.7	4.4	4.5	2.1	■	78.4	78.5	73.8	73.9	73.7	71.1	72.0	SD02	
	8	33.3	26.1	25.9	25.8	26.0	25.8	25.8	■	99.6	73.3	73.1	73.1	69.3	69.6	04G	
	9	32.8	26.0	25.8	25.7	25.9	25.6	25.7	0.4	■	73.3	73.2	73.2	69.3	69.5	90D	
	10	39.2	32.9	33.1	32.9	32.9	32.9	32.9	34.1	34.0	■	97.0	95.2	94.7	91.9	DRL-62	
	11	39.9	33.1	33.3	33.1	33.1	33.0	32.9	34.3	34.1	3.1	■	95.4	94.8	91.5	R85952	
	12	39.2	33.2	33.3	33.0	33.2	33.0	33.0	34.4	34.3	5.0	4.8	■	99.0	91.7	JX	
	13	39.2	41.9	41.7	41.4	41.2	39.2	39.2	42.3	42.6	5.6	5.5	1.0	■	92.4	ZJA	
	14	39.7	42.4	42.2	41.9	41.6	39.2	39.7	44.2	44.5	8.8	9.3	9.0	8.2	■	AV2111	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

图5 不同毒株基因序列比较分析

3 讨论与小结

本试验应用 RT-PCR 检测,对辽宁省某地发病鸭初步鉴定为新型鸭肝炎病毒,并使用易感鸭胚对病料进行分离传代培养,该分离株经病毒含量测定、半数鸭胚致死量测定、本动物回归试验、血清中和试验鉴定为为 DHV-C 型鸭肝炎病毒,并命名为 YK 株。

目前鸭病毒性肝炎的预防与治疗主要以 I 型的弱毒疫苗和卵黄抗体制剂为主,但 I 型和新型的鸭肝炎病毒之间不具备交叉保护。本研究中成功分离到 DHV-C 型鸭肝炎病毒,为进一步研制针对 DHV-C 型鸭肝炎病毒的抗体制剂或疫苗奠定了基础。

参考文献:

[1] 陆承平. 兽医微生物学[M]. 3版. 北京:中国农业出版社, 2001.
 [2] 刘美玲. 鸭病毒性肝炎的流行病学特征及防制[J]. 中国畜

牧兽医, 2008,35(7): 103-104.

[3] Kim M C, Kwon Y K, Joh S J, *et al.* Recent Korean isolates of duck hepatitis virus revealed the presence of a newgeno- and serotype when compared to duck hepatitis virus type 1 type strain [J]. Arch Virol, 2007,152(11): 2059-2072.
 [4] Wang L, Pan M, Fu Y, *et al.* Classification of duck hepatitis virus into three genotypes based on molecular evolutionary analysis[J]. Virus Genes, 2008,37(1): 52-59.
 [5] 韦天超,石梦霞,兰奉瑜,等. 一株广西新型鸭肝炎病毒的分离与初步鉴定[J]. 广西畜牧兽医, 2012,28(5): 259-260.
 [6] 戴玉婷,王杉,宋扬,等. 鸭甲肝病毒 VP1 基因克隆及序列分析[J]. 中国兽药杂志, 2015,49(2): 18-21.
 [7] 孙林杰,王雪平,宋国亮,等. 一株鸭肝炎病毒的分离与鉴定[J]. 中国兽药杂志, 2014,48(4): 15-18.
 [8] 张雪,龚文孝,胡勇,等. I 型鸭肝炎病毒基因 C 型株的分离与鉴定[J]. 动物医学进展, 2015,36(1): 23-26.
 [9] 中国兽药典委员会. 中华人民共和国兽药典[S]. 2010 版. 北京:中国农业出版社, 2011.

(编辑:李文平)