五株猪流行性腹泻病毒的分离鉴定及序列分析

王贵华^{1,2},于萍萍^{1,2},满坤^{1,2},吴珊珊^{1,2},刘明明^{1,2},孟萌^{1,2},赵亚荣^{1,2*}

(1. 北京大北农科技集团股份有限公司动物医学研究中心,北京 100195;

2. 北京市畜禽生物制品工程技术研究中心,北京 100195)

[收稿日期] 2015-04-18 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280(2016)07-0013-07 [中图分类号] S852.65

[摘要] 为研究猪流行性腹泻病毒的流行情况并分析该病毒的培养特性,对甘肃、北京、河北、山西、浙江五个猪场送检的疑似猪流行性腹泻病猪小肠内容物,用 RT-PCR 方法进行检测,证明为猪流行性腹泻病毒核酸阳性。然后将阳性病料进行传代培养、病毒含量测定以及特异性检验,证明获得五株猪流行性腹泻病毒,分别命名为 Ningxia9、Beijing5、Gaocheng8、Shanxi1、Zhejiang08。对分离的毒株进行 S 基因全长测序及氨基酸序列分析。结果表明:五株分离毒株在盲传 19 代开始出现明显的细胞病变,盲传到 24 代,出现稳定的细胞病变且五株分离毒株的 24 代病毒含量在 $10^{4.5\sim 5.0}$ TCID₅₀/mL 之间;用 S 蛋白进行进化树分析表明,五株分离毒株与近年来国内流行毒株亲缘关系很近,在同一个进化分支上;分离的五株野毒株之间的氨基酸同源性高达 99.2%~99.9%,而这五株野毒与 GenBank 上提交的 2011 年、2012 年分离的野毒株之间的氨基酸同源性为 98.4%~99.9%;实验室分离毒株及国内近年流行毒株均与国内外经典毒株存在一定的共性,即特定位置氨基酸的插入、缺失或置换。

[关键词] 猪流行性腹泻病毒;分离鉴定;序列分析

作者简介: 王贵华,博士,从事动物疫苗与诊断制品研究。

通讯作者: 赵亚荣。E-mail: zhaoyarong@live.cn

参考文献:

- [1] Saif Y M. 禽病学[M]. 北京:中国农业出版社,2012.
- [2] 李井春. 禽网状内皮组织增殖症研究进展[J]. 现代畜牧兽医,2011(6):34-36.
- [3] Jackson C A, Dunn S E, Smith D I, *et al.* "Nakanuke" and reticuloendotheliosis in chickens following vaccination with herpes virus of turkeys(HVT)[J]. Aust Vet J,1977,53(9):457-459.
- [4] Kawamura H, Wakabayashi T, Yamaguchi S, *et al.* Inoculation experiment of Marek's disease vaccine contaminated with a reticuloendotheliosis virus[J]. Natl Inst Anim Health Q, 1976, 16(4): 135-140.
- [5] Yuasa N, Yoshida I, Taniguchi T. Isolation of a reticuloendotheliosis virus from chickens inoculated with Marek's disease vaccine [J]. Natl Inst Anim Health Q, 1976, 16(4): 141-151.
- [6] Wei K, Sun Z, Zhu S, *et al.* Probable congenital transmission of reticuloendotheliosis virus caused by vaccination with contaminated vaccines [J]. PloS One, 2012, 7(8):e43422.
- [7] 中华人民共和国兽药典[M]. 北京:中国农业出版社,2010.
- [8] Morgan R A, Cornetta K, Anderson W F. Applications of the polymerase chain reaction in retroviral-mediated gene transfer and the analysis of gene-marked human TIL cells[J]. Hum Gene Ther, 1990, 1:135-149.
- [9] 李启红,杨承槐,刘丹,等. 鸡马立克病活疫苗中污染禽网状内皮组织增生症病毒检测方法的建立[J]. 中国兽医杂志, 2014,48(11):81-84.
- [10] 李莉莉. 检测禽网状内皮组织增生症病毒的间接免疫荧光试验建立及应用[D]. 扬州大学,2014.

Isolation and Identification of Five Porcine Epidemic Diarrhea Virus Strains and Sequence Analysis

WANG Gui-hua^{1,2}, YU Ping-ping^{1,2}, MAN Kun^{1,2}, WU Shan-shan^{1,2},
LIU Ming-ming^{1,2}, MENG Meng^{1,2}, ZHAO Ya-rong^{1,2*}

(1. Veterinary Medicine Research Centre of Beijing Da BeiNong Group, Beijing 100195, China;

2. Beijing Engineering Research Center of Biological products in Livestock and Poultry, Beijing 100195, China)

Abstract: In order to research epidemiology and culture specificity of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV), five feces samples from piglets suffering severe diarrhea in farms from Gansu, Beijing, Hebei, Shanxi and Zhejiang, were confirmed as PEDV positive by RT-PCR. Then these five samples were cultured by vero cell line to 24 passages, the five cultures were titrated and sequenced full long of S gene. Results showed that cytopathic effect (CPE) appeared from 19th to 24th passages, and virus titer were between 10^{4.5~5.0} TCID₅₀/mL. Sequence analysis showed that the amino acid homology was 99.2% ~ 99.2% among five wild strains, 98.4% ~ 99.9% among these five strains and the wild strains on GenBank from 2011 to 2012. Furthermore, the isolates, domestic pandemic strains and classic strains had certain commonality such as specific amino acid insertions and deletions or replacement.

Key words: porcine epidemic diarrhea virus; isolation and identification; sequence analysis

猪流行性腹泻病毒 (porcine epidemic diarrhea virus, PEDV) 为猪的一种冠状病毒,可引起猪的急性、高度接触性肠道传染病猪流行性腹泻 (porcine epidemic diarrhea, PED)。该病主要特征为脱水、呕吐和腹泻。各种年龄和品种的猪均易感,尤其是对哺乳仔猪危害最为严重,发病率高达 100%,死亡率为 30% ~ 80%,是导致仔猪早期死亡的主要疾病之一^[1-2]。1971 年英国首次报道了本病,随后在日本、德国和比利时等许多国家均有报道,我国 1976 年首次报道^[3],2013 年美国爆发疫情,2014 年德国、加拿大报道了 PED 的流行^[4-5],目前该病已经成为影响养猪业的重要腹泻病之一。

PEDV 为单股正链 RNA 病毒,S 糖蛋白位于病毒粒子表面,在刺激机体产生中和抗体过程中发挥重要作用,其中的 S1 结构域包含主要中和抗原表位^[6-7]。S 基因序列分析发现,在不同地区不同时间分离的毒株之间变异都很大,近几年的流行毒株和 2010 年以前的毒株以及传统疫苗毒株的差异主要存在于 S 基因^[8],因此 S 基因是分析 PEDV 流行毒株的遗传变异和流行特点的主要切入点。

本研究对甘肃、北京、河北、山西、浙江五个猪场疑似猪流行性腹泻病猪采集小肠内容物,RT-PCR 方法进行检测确定为猪流行性腹泻病毒

感染。采用细胞培养法分离五株猪流行性腹泻病毒,通过对 S 基因序列进行了分析,结果表明该分离株与国内当前流行株同源性很高,为进一步疫苗的研究和猪流行性腹泻的防控奠定了基础。

1 材料

1.1 病料 疑似猪流行性腹泻病猪小肠内容物,收集于甘肃、北京、河北、山西、浙江五个地方猪场。

1.2 细胞和培养基 Vero 细胞由北京大北农集团动物医学研究中心保管和供应,DMEM 购自 Hyclone 公司。

1.3 主要试剂 PCR 反应试剂、DNA Marker、RNA 提取试剂盒、琼脂糖凝胶 DNA 回收试剂盒、T 载体等购自天根生化公司;胎牛血清和胰蛋白酶均购自 GIBCO 公司;PEDV 特异性血清由大北农集团动物医学研究中心制备。

1.4 引物合成和基因测序 由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。

2 方法

2.1 病料的处理 取病猪小肠适量,刮取肠粘膜和内容物,充分研磨,按照 1 : 5 的比例(重量 : 体积)加入 PBS,混匀,反复冻融 3 次,离心取上清,0.22 μm 滤膜过滤,滤液分装备用。

2.2 RT-PCR 检测 将病料进行 RT-PCR 检

测,根据病毒 S 蛋白编码基因的序列设计引物:正向引物为 5' - GGATACTTTGGCCTCTTGTG - 3'; 反向引物 5' - CGCACTCGGATTACTCACAGC - 3'。PEDV 预计扩增片段为 484 bp。取处理好的病料上清液,按照 QIAamp 柱式 RNA 提取试剂盒(Qiagen)提取 RNA。用 M - MLV 合成 cDNA,总反应体系 20 μ L:RNA 3 μ g、Oligo(dT) 18 Primer (10 μ mol/L) 0.5 μ L、dNTPs 1 μ L、5 $\times$ First - Stand Buffer 4 μ L、RNasin 0.5 μ L、M - MLV 0.5 μ L、RNase - free Water 补足至 20 μ L。轻轻混匀,37 $^{\circ}$ C 水浴 60 min,95 $^{\circ}$ C 水浴 5 min 后,立即冰浴。以 cDNA 为模板,建立 50 μ L PCR 反应体系:10 $\times$ PCR Buffer 5 μ L、dNTPs 2 μ L、正向引物 1 μ L、反向引物 1 μ L、cDNA 2 μ L、Taq 酶 0.5 μ L、ddH₂O 补足至 50 μ L。将 PCR 反应体系置 PCR 仪内,95 $^{\circ}$ C 预变性 5 min,95 $^{\circ}$ C 45 s、50 $^{\circ}$ C 1 min、72 $^{\circ}$ C 2 min 进行 32 个循环后,72 $^{\circ}$ C 延伸 5 min。PCR 产物在 1% 琼脂糖凝胶电泳中进行检测。

2.3 接种细胞和传代 取长满单层的 Vero 细胞,用 pH7.4 的 PBS 洗三次,按照 10% 的比例接种上述处理物,添加胰蛋白酶至终浓度 10 μ g/mL,37 $^{\circ}$ C 吸附 1 h,然后加入含终浓度 10 μ g/mL 胰蛋白酶的无血清 DMEM 维持液,37 $^{\circ}$ C 5% CO₂ 培养箱培养,逐日观察,若无 CPE 则 72 h 收获,反复冻融 3 次后按上述方法传代。如此操作盲传,观察是否产生 CPE。同时设置空白细胞作为对照。

2.4 病毒含量测定 将分离毒株第 24 代毒用细胞维持液进行 10 倍系列稀释,取 10⁻⁴、10⁻⁵、10⁻⁶、10⁻⁷ 四个稀释度,每个稀释度分别接种长满 Vero 细胞单层的 96 孔细胞板 6 孔,100 μ L/孔,同时设阴性对照细胞 6 孔,37 $^{\circ}$ C 5% CO₂ 培养箱培养 72 ~ 120 h,观察细胞病变,细胞颗粒增多、圆缩、细胞破损、脱落判为感染。同时阴性对照组细胞孔应不出现细胞病变。采用 Reed - Muench 法,计算 TCID₅₀。

2.5 病毒的特异性检验 将第 24 代毒用 DMEM 液稀释至 10^{3.0}TCID₅₀/mL 与等量的 PEDV 特异性血清混合,置 37 $^{\circ}$ C 中和 1 h,接种长满 Vero 细胞单层的 96 孔细胞板 4 孔,同时设不中和的病毒阳性对照细胞 4 孔和仅接种细胞维持液的阴性对照细胞 4 孔,37 $^{\circ}$ C 5% CO₂ 培养箱培养 72 ~ 120 h,观察细胞病变,中和组和阴性对照组均不应出现细胞病变,而病毒对照组应出现细胞病变。

2.6 S 基因序列分析 参照 GenBank 中的 PEDV - S 基因序列设计三对特异性引物。

S1 - p1: 5' - GTTGAAGAATGGTAAGTTGCTAG - 3';

S1 - p2: 5' - ATAAAGAATACGCTGAATGGC - 3';

S2 - p1: 5' - GGCCTGACGATGACGTTTC - 3';

S2 - p2: 5' - CCATTAGAACAGCGCTTATAGTCT - 3';

S3 - p1: 5' - TTTTAAATAAAGTGGTACTAATGG - 3';

S3 - p2: 5' - CTGTGTCAATCGTGTATTGAAAAAG - 3'。

按照 2.2 的方法分别提取五株分离毒株 24 代病毒的 RNA 并进行反转录和 PCR, S1 片段 PCR 反应条件为:95 $^{\circ}$ C 预变性 5 min,95 $^{\circ}$ C 50 s、52 $^{\circ}$ C 1 min、72 $^{\circ}$ C 2 min 进行 32 个循环后,72 $^{\circ}$ C 延伸 5 min。S2 片段 PCR 反应条件为:95 $^{\circ}$ C 预变性 5 min,95 $^{\circ}$ C 50 s、50 $^{\circ}$ C 1 min、72 $^{\circ}$ C 2 min 进行 32 个循环后,72 $^{\circ}$ C 延伸 5 min。S3 片段 PCR 反应条件为:95 $^{\circ}$ C 预变性 5 min,95 $^{\circ}$ C 50 s、54 $^{\circ}$ C 1 min、72 $^{\circ}$ C 2 min,进行 32 个循环后,72 $^{\circ}$ C 延伸 5 min。扩增产物经电泳和回收后连接到 T 载体进行测序分析,对 S1、S2、S3 序列进行拼接,将拼接完全的 S 基因进行氨基酸序列推导,并进行遗传进化分析和序列比对。

3 结果

3.1 RT - PCR 检测结果 将病料提取物进行 RT - PCR 检测,扩增 S 基因片段为 484 bp,结果见图 1。

M: DNA Marker; 1 - 5: 样品; 6: 阴性对照

图 1 病料中 PEDV 的 RT - PCR 检测结果

3.2 病毒的分离培养结果 将上述样品处理后接种于 Vero 细胞,经过 19 代盲传后开始出现细胞病变,再继续传 5 代以后,细胞病变出现时间和病变类型基本稳定,约在接种后 48 - 52 h 出现明显细胞病变,主要表现为细胞颗粒增多,圆缩,细胞破损,脱落(图 2)。

3.3 病毒含量测定 将第 24 代病毒进行病毒含

量测定, Ningxia9 为 $10^{4.5}$ TCID₅₀/mL, Beijing5 为 $10^{4.75}$ TCID₅₀/mL, Gaocheng8 为 $10^{5.0}$ TCID₅₀/mL, Shanxi1 为 $10^{4.5}$ TCID₅₀/mL, Zhejiang08 为 $10^{5.0}$ TCID₅₀/mL。

3.4 病毒的特异性检验 病毒中和试验结果表

明,分离的 PEDV 具有特异性,病毒被特异性血清中和后接种细胞没有出现 CPE,阴性对照也没有出现 CPE,接种病毒组细胞出现典型的 CPE。

3.5 S 基因序列分析结果 五株分离毒株 24 代病毒的 S 蛋白全长氨基酸序列进化树分析结果见图 3。

A - E:5 个分离株;F:阴性对照
图 2 猪流行性腹泻病毒病变图 (400 ×)

图 3 S 蛋白全长氨基酸序列进化树分析

PEDV 主要分为三个进化群,群 I 由本实验室分离的五株野毒株 (Ningxia9、Beijing5、Gaocheng8、Shanxi1、Zhejiang08) 以及 2011 年腹泻病爆发后各大高校和科研院所分别于 2011 年、2012 年分离的野毒株 (HB-2012-4、HB-2012-1、BJ-2011-1、BJ-2011-2、BJ-2011-3、GD-B、CH17-GZ、CH-SDLY-2011、ZMDZY-2011、ZB) 组成;群 II 主要由国内外经典毒株组成,包括中国 2004 年到 2007 年分离毒株 (DX、LJB-03、JS-2004-2、LZC、CH-S), 韩国毒株 (Parent DR13、attenuated DR13), 比利时毒株 (CV777), 法国毒株 (Br1-87), 日本毒株 (MK、83P-5);群 III 由一株韩国分离株 (Chinju99) 和两株日本分离株 (KH、NK) 组成。

根据推导的氨基酸序列进化树结果将群 I 中本实验室分离的五株野毒株以及 GenBank 上提交的 2011 年、2012 年分离的五个野毒株 (HB-2012-4、

HB-2012-1、BJ-2011-1、BJ-2011-2、BJ-2011-3) 与群 II 中国内外经典毒株 (attenuated CV777、attenuated DR13、CV777、Parent DR13、DX、LJB-03、JS-2004-2、LZC) 的全长 S 蛋白进行氨基酸序列比对分析,采用 ClustalW 法比对,有如下结果:实验室分离的五株野毒株 Ningxia9、Beijing5、Gaocheng8、Shanxi1、Zhejiang08 之间的氨基酸同源性高达 99.2%~99.9%,而这五株野毒与 GenBank 上提交的 2011 年、2012 年分离的野毒株之间的氨基酸同源性为 98.4%~99.9%,其中 BJ-2011-2 与 Beijing5、Shanxi1、Gaocheng8 之间的氨基酸同源性稍低,分别为 98.5%、98.8%、98.7%,CH-ZMDZY-2011 与本实验室分离的五株野毒同源性也较低为 98.4%~99.1%,说明本实验分离的野毒株与 2011 年腹泻大流行的毒株具有很高的同源性 (表 1)。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	■	99.4	99.2	99.3	99.4	99.1	98.5	99.1	98.9	98.4	99.1	99.1	99.0	98.9	98.8	93.3	92.5	92.5	93.1	93.0	93.3	94.9	95.3	94.6	92.3	92.8	93.3	1	Beijing5.pro
2	0.7	■	99.4	99.5	99.6	99.1	98.7	99.3	99.1	98.6	99.3	99.1	99.0	93.5	92.8	92.7	93.3	93.2	93.5	95.2	95.5	94.8	92.5	93.1	93.5	2	Gaocheng8.pro		
3	0.8	0.6	■	99.6	99.5	99.4	98.8	99.4	99.2	98.6	99.4	99.4	99.2	99.1	99.1	93.4	92.7	92.6	93.2	93.0	93.3	95.1	95.4	94.7	92.4	93.0	93.3	3	Shanxi1.pro
4	0.7	0.5	0.4	■	99.9	99.8	99.2	99.8	99.6	99.1	99.8	99.9	99.6	99.6	99.5	93.8	93.1	93.0	93.6	93.5	93.8	95.5	95.9	95.2	92.8	93.4	93.8	4	Zhejiang08.pro
5	0.7	0.4	0.5	0.1	■	99.7	99.1	99.7	99.6	99.0	99.7	99.8	99.6	99.5	99.4	93.9	93.2	93.1	93.7	93.6	93.8	95.6	95.9	95.2	92.9	93.5	93.8	5	Ningxia9.pro
6	0.9	0.7	0.7	0.2	0.3	■	99.1	99.7	99.6	99.1	99.6	99.8	99.6	99.6	99.4	93.8	93.0	93.0	93.7	93.5	93.8	95.4	95.8	95.1	92.9	93.3	93.8	6	BJ-2011-1.pro
7	1.5	1.3	1.2	0.8	0.9	0.9	■	99.1	99.0	98.4	99.0	99.2	99.0	98.9	98.8	93.6	92.8	92.5	93.3	93.5	93.4	95.0	95.3	94.6	92.5	93.2	93.4	7	BJ-2011-2.pro
8	0.9	0.7	0.7	0.2	0.3	0.3	0.9	■	99.6	99.1	99.6	99.9	99.7	99.5	99.4	93.8	93.0	93.0	93.6	93.4	93.7	95.4	95.8	95.1	92.8	93.3	93.7	8	BJ-2011-3.pro
9	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.0	0.4	■	99.0	99.4	99.6	99.4	99.4	99.7	93.8	93.0	93.0	93.6	93.4	93.7	95.4	95.8	95.1	92.8	93.3	93.7	9	CH-SDLY-2011(China).pro
10	1.6	1.4	1.4	0.9	1.0	0.9	1.6	0.9	1.0	■	98.8	99.1	99.0	98.9	98.8	93.3	92.6	92.5	93.3	93.1	93.4	95.0	95.4	94.6	92.5	92.9	93.4	10	CH-ZMDZY-2011(China).pro
11	0.9	0.7	0.7	0.2	0.3	0.4	1.0	0.4	0.6	1.2	■	99.6	99.4	99.4	99.3	93.6	92.9	92.8	93.7	93.3	93.8	95.3	95.8	94.9	92.9	93.2	93.8	11	HB-2012-4.pro
12	0.9	0.7	0.6	0.1	0.2	0.2	0.8	0.1	0.4	0.9	0.4	■	99.7	99.6	99.5	93.8	93.1	93.0	93.6	93.5	93.8	95.5	95.9	95.2	92.8	93.4	93.8	12	HB-2012-1.pro
13	1.0	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	1.0	0.3	0.6	1.0	0.6	0.3	■	99.4	99.3	93.9	93.2	93.1	93.6	93.5	93.7	95.4	95.7	95.0	92.8	93.4	93.7	13	CH17-GZ(China).pro
14	1.1	0.9	0.9	0.4	0.5	0.4	1.1	0.5	0.7	1.1	0.7	0.4	0.7	■	99.2	93.6	92.8	92.8	93.5	93.3	93.6	95.2	95.7	94.6	92.7	93.1	93.6	14	GD-R(China).pro
15	1.2	1.0	0.9	0.5	0.6	0.6	1.2	0.6	0.3	1.2	0.7	0.5	0.7	0.8	■	93.8	93.0	93.0	93.6	93.3	93.7	95.4	95.7	95.0	92.8	93.3	93.7	15	ZB(China).pro
16	7.1	6.8	6.9	6.4	6.3	6.5	6.7	6.5	6.5	7.0	8.7	6.4	6.3	6.7	6.5	■	98.8	98.5	96.4	96.7	96.7	98.3	96.7	96.0	95.7	97.5	96.6	16	83P-5.pro
17	7.9	7.6	7.7	7.2	7.1	7.3	7.5	7.3	7.3	7.8	7.5	7.2	7.1	7.5	7.3	1.2	■	98.3	95.7	96.2	96.0	95.5	95.9	95.2	95.0	96.7	96.0	17	Attenuated CV777.pro
18	8.0	7.7	7.8	7.3	7.2	7.4	7.9	7.4	7.4	7.9	7.5	7.3	7.2	7.6	7.4	1.5	0.7	■	95.4	95.8	95.7	95.3	95.7	95.0	94.8	96.3	95.7	18	attenuated DR13.pro
19	7.2	7.0	7.2	6.7	6.6	6.6	6.1	6.7	6.7	7.1	8.6	6.7	6.8	6.7	3.7	4.5	4.7	■	95.9	99.7	95.4	96.0	95.2	98.8	95.4	99.4	19	Br1-87.pro	
20	7.4	7.1	7.3	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	7.2	7.1	6.8	6.8	7.1	7.0	3.3	3.9	4.3	■	96.2	95.7	96.1	95.4	95.2	95.5	96.0	20	CH-S(China).pro	
21	7.1	6.8	7.0	6.5	6.4	6.4	6.9	6.6	6.6	6.9	5.4	6.5	6.6	6.7	6.6	3.4	4.2	4.4	0.3	■	95.7	96.2	95.4	99.1	95.7	99.7	21	CV777.pro	
22	5.3	5.0	5.1	4.6	4.6	4.7	5.2	4.7	4.7	5.2	4.9	4.6	4.8	4.9	4.8	3.8	4.6	4.9	4.7	4.4	■	98.0	98.6	94.8	95.2	95.7	22	DX(China).pro	
23	4.9	4.6	4.7	4.2	4.2	4.3	4.9	4.3	4.3	4.8	4.3	4.2	4.4	4.5	4.4	3.4	4.2	4.5	4.2	4.0	3.9	2.0	■	97.8	95.4	95.5	96.2	23	JS-2004-2(China).pro
24	5.6	5.4	5.5	5.0	4.9	5.1	5.6	5.1	5.1	5.6	5.3	5.2	5.2	5.2	4.1	4.9	5.2	5.0	4.7	4.7	1.5	2.3	■	94.5	94.9	95.4	24	LJB-03(China).pro	
25	0.1	7.9	0.0	7.5	7.5	7.5	7.9	7.6	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	4.4	5.2	5.4	1.2	4.9	0.9	5.4	4.0	5.7	■	94.0	90.0	25	LZC(China).pro
26	7.5	7.3	7.4	6.9	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.5	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	2.6	3.4	3.8	4.8	4.6	4.5	5.0	4.5	5.3	5.4	■	95.6	26	MK(Japan).pro
27	7.1	6.8	7.0	6.5	6.4	6.4	6.9	6.6	6.6	6.9	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	3.5	4.2	4.4	0.6	4.1	0.3	4.4	3.9	4.7	1.2	4.5	■	27	Parent DR13(Korea).pro

表 1 群 I 中流行毒株与群 II 中国内外经典毒株之间 S 蛋白氨基酸序列比较

群 I 中的十个毒株与群 II 中的国内外经典毒株,无论是野毒株还是疫苗株,氨基酸序列变化存在如下共性:存在两个部位的氨基酸插入,一个是位于 59~62aa 位,插入了 QGVN 四个氨基酸,另一个是位于 140 aa 位,插入了 N 一个氨基酸;存在一个部位氨基酸的缺失,位于 163~164 位的两个氨基酸缺失,N(D)I(T);存在 26 处氨基酸置换,氨基酸置换个数由 1 个到 5 个不等 (图 4、表 2)。

4 讨论

PEDV 对细胞、培养条件的要求较高,自 20

世纪 70 年代报道以来,直到 1988 年 Hoffman 等通过在培养基中添加胰酶的方法才首次利用细胞培养方法成功分离到一株 PEDV^[9],此后陆续有采用相同的方法成功分离到 PEDV 的报道^[10-11]。本研究参考国内外文献,在维持液中加入终浓度 10 μg/mL 的胰蛋白酶,利用 Vero 细胞成功分离到五株 PEDV。

已知 PEDV 为冠状病毒,可将其 S 蛋白人为划分为 S1 区 (1~789aa) 和 S2 区 (790~1387aa)。其中,S1 区为主要的抗原表位存在区^[12-13],序列分析

表2 群I中变异毒株与群II中国内外经典毒株之间
S蛋白全长的氨基酸差异

变异情况	氨基酸个数	氨基酸变化	位置
替换	3	QST→SAN	27~29
	4	SMNS→IGEN	55~58
	1	S→T	64
	5	GTGIE→AGQHP	68~72
	1	L→V	82
	1	Y→H	84
	2	DS→RG	86~87
	1	Q→H	89
	1	I→T	120
	2	DN→SI	130~131
	1	V→A	138
	3	DGK→EHS	161~162
	1	A→S	179
	1	H→Y	184
	1	I(L)→F	187
	1	R→K	197
	3	K(R)RS→SGG	201~203
	1	T→E	211
	1	Y→S	228
	1	E→Q	230
1	S(T)→I	238	
2	DS→EP	247~248	
1	L→V	271	
1	M→I	305	
1	L→F	347	
1	T→I	369	
插入	4	QGVN	59~62
	1	N	140
缺失	2	N(D)I(T)	163~164

表明26处置换全位于S1蛋白氨基酸序列之中,主要位于前369 aa中,且氨基酸的插入和缺失也位于该区域中。位于中和抗原表位83~276 aa处的的替换有19处;位于线性表位248~280为2处。

冠状病毒S1基因的变化能体现病毒的变异情况。由氨基酸序列比对分析表明流行毒株的氨基酸序列变化主要存在于S1区,氨基酸序列的变化有可能是导致病毒变异的原因^[14-17]。S基因氨基酸进化树分析表明,本实验室分离的五株猪流行性腹泻病毒株与国内当前流行株同源性很高,将其致弱作为候选疫苗株,对于猪流行性腹泻防控具有重要的实践意义。

参考文献:

[1] Wood E N. An apparently new syndrome of porcine epidemic diarrhea[J]. Vet Rec, 1997, 100: 243-244.
[2] 陈建飞,冯力,时洪艳,等.猪流行性腹泻疫苗的研究[J].猪

业科学,2010,12:50-51.

- [3] 蔡宝祥. 家畜传染病学(第三版)[M]. 北京:中国农业出版社,2002:213-214.
[4] Vlasova A N, Marthaler D, Wang Q, *et al.* Distinct characteristic sand complex evolution of PEDV strains North America, May 2013 - February 2014 [J]. Emerging Infectious Disease, 2014, 20 (10): 1620-1628.
[5] Wang L Y, Beverly B, Zhang Y. New variant of porcine epidemic diarrhea virus, United States, 2014 [J]. Emerging Infectious Diseases, 2014, 20 (5): 917-919.
[6] Duarte M, Tobler K, Bridgen A, *et al.* Sequence of the spike protein of the porcine epidemic diarrhea virus [J]. J Gen Virol, 1994, 75: 1195-1200.
[7] Follis K E, York J, Nunberg J H. Furin cleavage of the SARS coronavirus spike glycoprotein enhances cell-cell fusion but does not affect virion entry [J]. Virology, 2006, 350: 358-369.
[8] Sun R, Leng Z, Zhai S L, *et al.* Genetic variability and phylogeny of current Chinese porcine epidemic diarrhea virus strains based on spike, ORF3, and membrane genes [J]. The Scientific World Journal, 2014, (2014): 8.
[9] Hoffmann M, Wyler R. Propagation of the virus of porcine epidemic diarrhea in cell culture [J]. J Clin Microbiol, 1988, 11: 2235-2239.
[10] 李树根,李力施,霍燕琼,等.使用细胞培养单层分离猪流行性腹泻病毒[J].中国兽医科技,1991,10:24-25.
[11] 童昆周,李力复,林志雄,等.猪流行性腹泻弱毒疫苗的研究[J].中国兽医科技,1996,26(1):3-4.
[12] Chang S H, Bae J L, Kang T J, *et al.* Identification of the epitope region capable of inducing neutralizing antibodies against the porcine epidemic diarrhea virus [J]. Mol Cells, 2002, 14: 295-299.
[13] Sun D, Feng L, Chen J, Shi H, *et al.* Cloning and sequence analysis of the spike protein gene of porcine epidemic diarrhea virus CH/JL strain and identification of its antigenic region containing linear epitopes [J]. Chinese Journal of Virology, 2007, 23: 224-229.
[14] Chen J F, Liu X Z, Shi H Y, *et al.* Detection and molecular diversity of spike gene of porcine epidemic diarrhea virus in China [J]. Viruses, 2013, 5: 2601-2613.
[15] Wang J B, Zhao P J, Guo L H, *et al.* Porcine epidemic diarrhea virus variants with high pathogenicity [J]. Emerging Infectious Diseases, 2013, 19: 2048-2049.
[16] Li W T, Li H, Liu Y B, *et al.* New variants of porcine epidemic diarrhea virus [J]. Emerging Infectious Diseases, 2012, 18: 1350-1353.
[17] 刘孝珍,陈建飞,时洪艳,等.2011年猪流行性腹泻病毒的遗传变异分析[J].中国预防兽医学报,2012,3:180-183.