1,4-二氧喹醛酸酯合成及抑菌活性研究

马明真,李凤梅,高宝生,宋俊芬,罗星,李华*

(中国农业大学烟台研究院,烟台 264670)

[收稿日期] 2016-03-19 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2016) 06-0026-07 [中图分类号] S859.79

[摘要] 为了合成两种具有抑菌活性的1,4-二氧喹醛酸酯,即1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯和1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯,以苯并呋咱为原料,经Beirut反应、酯交换反应,合成了两种喹醛酸酯;1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯合成产率为29.3%,1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯合成产率为18.3%。两种1,4-二氧喹醛酸酯对大肠杆菌、金葡萄球菌、青霉菌和枯草杆菌均有明显的抑菌活性。通过测定产物的熔点和光谱分析证明系为所合成的目标产物。

[关键词] 苯并呋咱;酯交换反应;喹醛酸酯;抑菌活性

Study on the Synthesis and Bacteriostasis of 1,4-dioxoquinoline Aldehydes Esters

MA Ming-zhen, LI Feng-mei, GAO Bao-sheng, SONG Jun-fen, LUO Xing, LI Hua*

(China Agriculture University(Yantai), Yantai 264670, China)

Abstract: Using benzofuroxan as raw material, two kinds of 1,4-dioxoquinoline aldehydes esters, 1,4-dioxoquinoline-3-methyl-2-phenyl formate and 1,4-dioxoquinoline-3-methyl-2-cinnamylformate, were synthesized by Beirut reaction and ester exchange reaction. The yield of 1,4-dioxoquinoline-3-methyl-2-phenyl formate was 29.3% and the yield of 1,4-dioxoquinoline-3-methyl-2-cinnamylformate was 18.3%. Two kinds of 1,4-dioxoquinoline aldehyde ester have obvious antibacterial activity to *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Penicillium sp.* and *Bacillus subtilis*. It was proved that new compounds synthesized in experiment were target compounds by measuring the melting point and spectral analysis.

Key words: benzofuroxan; ester exchange reaction; quinoline aldehydes esters; antibacterial activity

1,4-二氧喹啉类衍生物具多种生物活性^[1-3],已在许多领域中广泛报道^[4-6]。其具有明

显的抑菌活性^[7-8],并能促进饲料消化吸收和提高饲料转化率^[9-10],对畜禽的饲养有重大意义,所以

基金项目:烟台市科技发展计划项目(2012ZH247)

作者简介:马明真,从事设施农业科学与工程专业方面研究。

通讯作者:李华。E-mail:8540890692@qq.com

被广泛用作兽药^[11-12]进行研究。

国家级一类新兽药喹烯酮, 具有抑菌促生效果好、低毒、低残留、无三致作用的特点, 且使用安全, 是农业部重点推广的兽药^[10,13]。目前针对喹烯酮的研究多集中在合成工艺、药理、毒理等方面^[13-15], 较少涉及喹烯酮的转型升级及结构创新。在保证安全有效、生物学活性较高的前提下, 有必要制备各具特色、结构多样的喹啉衍生物, 以适应我国畜禽养殖疾病控制和食品安全的需求。

本文以苯并咪唑为原料, 经 Beirut 反应、酯交换反应, 合成了两种新喹啉衍生物, 即 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯和 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯, 并用滤纸片法^[5]对其抑菌活性进行了研究, 以期为新兽药的制备提供参考。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂 分析天平, WT-B 型, 上海精密科学仪器产品; 恒温磁力搅拌器, 85-1 型, 江苏荣华仪器产品; 循环水式真空泵, SHZ-D 型, 河南巩义予华仪器产品; 万调万用电炉, DL-1 型, 山东龙口先科仪器产品; 电热恒温鼓风干燥箱, DHG-9140A 型, 嘉兴中新医疗仪器产品; 压力蒸汽灭菌

器, YX280A 型, 上海三申医疗器械产品; 电热恒温培养箱, 420 型, 山东龙口先科仪器产品; 超净工作台, SW-CJ 型, 苏州安泰空气技术公司产品; 游标卡尺、接种针、打孔器、镊子、滤纸等均为市售。

苯并咪唑(按文献^[16-17]方法自制); 乙醇、苯酚, 均为分析纯, 天津永大化学试剂产品; 乙酰乙酸乙酯, 分析纯, 天津福晨化学试剂产品; 乙酸乙酯、甲醇, 均为分析纯, 天津科密欧化学试剂产品; 盐酸, 分析纯, 烟台三和化学试剂产品; 三乙胺, 分析纯, 天津广成化学试剂产品; 肉桂醇, 分析纯, 上海阿拉丁生化科技产品; 营养琼脂, 青岛海博生物技术产品。供试菌种: 大肠杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌、青霉菌。以上菌种均由中国农业大学生物所提供。

1.2 喹啉酸酯合成

1.2.1 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯的制备 取苯并咪唑 20 g (163.93 mmol) 加入 25 mL 乙酰乙酸乙酯, 水浴加热 (40 °C) 搅拌溶解, 溶液呈橙黄色。冷水浴 (15 °C), 缓慢加入 40 mL 三乙胺, 溶液呈红色, 静置在底部和边缘可看到土黄色晶体析出, 24 h 后抽滤, 乙醇洗涤得粗品。60 °C 烘干, 甲醇重结晶。合成路线如图 1 所示。

图1 Beirut 反应

1.2.2 1,4-二氧喹啉酸酯制备 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯的合成: 取 5 g 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯放入烧杯中, 加入 25 mL 乙醇, 加热搅拌 40 min, 温度控制在 50 ~ 60 °C, 全部溶解后, 加入 2.5 g 苯酚, 回流 5 min (77 °C) 后, 滴加 1 mL 盐酸, 继续回流 2 h, 减压蒸馏回收乙醇, 得深红色粘稠反应产物, 加 50 mL 乙酸乙酯, 室温静置, 析出晶体。抽滤, 用蒸馏水洗

涤, 得土褐色固体。60 °C 烘干, 乙酸乙酯重结晶。合成路线如图 2 所示。

1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯的合成: 取 5 g 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯放入烧杯中, 加入 30 mL 乙醇, 加热搅拌 40 min, 温度控制在 50 ~ 60 °C, 全部溶解后, 加入 4 mL 肉桂醇, 回流 5 min (77 °C) 后, 滴加 1.5 mL 盐酸, 继续回流 2 h, 减压蒸馏回收乙醇, 得深红色粘

稠反应产物,加 50 mL 乙酸乙酯,室温静置,用超声分散 20 分钟,析出沉淀。抽滤,用蒸馏水洗涤,得

褐色固体。60℃烘干,乙酸乙酯重结晶。合成路线如图 3 所示。

图 2 与苯酚的酯交换反应

图 3 与肉桂醇的酯交换反应

1.3 抑菌试验

1.3.1 培养基的制作 称取营养琼脂 17.5 g,放入盛有 500 mL 蒸馏水的烧杯中,在电炉上加热,用玻璃棒不断搅拌,防止琼脂粉末粘到烧杯底部,溶解至溶液呈通澈状态,停止加热,稍稍冷却后倒入三角瓶中,在压力蒸汽灭菌器中高压灭菌 20 min。

1.3.2 滤纸片法 将高压灭菌后的琼脂培养基趁热倒入灭菌培养皿中,冷却凝固后,用接种针从菌落上轻轻抹上一些细菌,均匀地涂抹在培养皿中的琼脂平板上;选取优质滤纸,用打孔器打出直径为 6 mm 的滤纸片,用压力蒸汽灭菌器高压灭菌 20 min;用蒸馏水分别配制 0.5、1.5、2.0、2.5 mg/mL 的 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯和 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯溶液各 50 mL;用无菌镊子夹取一定数量的灭菌滤纸片,放在药品中充分浸湿后,贴在含菌培养皿上,每只培养皿内间隔一定的距离贴 3 片,用浸有去离子水的滤纸做空白对照,每种处理做两组重复,以上操作均在超净工作台上进行;将培养皿放入 28℃ 电热恒温培养箱中培养 48 h;用游标卡尺测量抑菌圈直

径。试验中出现的抑菌圈直径越大,说明药品的抑菌活性越强。

2 结果

2.1 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯制备 苯并咪唑和乙酰乙酸乙酯的用量比值为 1:1.25,保持乙酰乙酸乙酯过量,反应进行的较为彻底,产率为 65.44%,熔点 153.1℃~153.9℃。

2.2 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯制备 本文研究了两种 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯的制备反应,均在浓盐酸催化下进行。苯酚与 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯发生酯交换反应,得到土红色松散晶体,产率为 29.3%,熔点 135.9℃~136.8℃;肉桂醇与 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯发生酯交换反应,得到肉色松散晶体,产率为 18.3%,熔点 138.7℃~139.1℃。

2.3 抑菌试验 用去离子水作对照,采用滤纸片法对两种喹啉酯进行了抑菌活性测试。结果表明,不同浓度的 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯和 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯对大肠杆菌、金葡萄球菌、青霉菌和枯草杆

菌的抑菌圈直径均明显比对照组大,随着药品浓度的增加,抑菌圈直径呈明显增大的趋势(表1、表2)。在1.5 mg/mL浓度下1,4-二氧喹啉-3-

甲基-2-甲酸苯酯对金葡萄球菌和1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯对大肠杆菌的抑菌照片见图4。

表1 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯体外抑菌试验的抑菌圈直径

单位:mm

菌株	药品浓度/(mg·mL ⁻¹)					
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
大肠杆菌	5.8±0.6	9.2±1.2	14.3±1.6	22.6±1.5	35.5±2.1	38.6±2.3
金葡萄球菌	5.6±0.7	6.5±1.1	16.5±1.4	23.3±1.8	28.1±1.9	37.2±2.0
青霉菌	6.0±0.5	7.6±1.3	8.3±1.5	23.7±1.6	29.2±1.9	30.9±2.2
枯草杆菌	6.0±0.8	8.5±1.2	8.6±1.4	23.9±1.9	29.8±2.2	33.5±2.1

(x±s, n=5)

表2 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯体外抑菌试验的抑菌圈直径

单位:mm

菌株	药品浓度/(mg·mL ⁻¹)					
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
大肠杆菌	6.0±0.4	8.3±1.0	9.8±1.5	25.8±1.7	27.3±2.3	34.1±2.0
金葡萄球菌	5.9±0.5	10.0±1.1	10.7±1.4	27.3±1.5	35.8±2.0	38.4±2.2
青霉菌	6.0±0.7	6.5±1.3	11.2±1.6	17.5±1.9	23.5±1.9	29.3±2.3
枯草杆菌	5.8±0.3	6.9±1.1	9.4±1.3	22.1±1.8	25.6±2.1	30.9±2.3

(x±s, n=5)

图4 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯对金葡萄球菌的抑菌结果(A)和

1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯对大肠杆菌(B)的抑菌结果(化合物质量浓度为1.5 mg/mL)

2.4 目标产物结构分析

2.4.1 红外光谱(IR) 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯:2996 cm⁻¹强峰是-CH₃伸缩振动吸收谱带,1738 cm⁻¹强峰是C=O的伸缩振动吸收谱带,1332 cm⁻¹强峰是N-O伸缩振动吸收谱带,1244 cm⁻¹强峰是C-O伸缩振动吸收谱带。770 cm⁻¹中强峰是苯环邻位双取代特征吸收谱带。其中1332 cm⁻¹的强吸收峰是取代喹啉-1,4-二氧化物的特征吸收峰^[18]。

1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯:2997 cm⁻¹强峰是-CH₃伸缩振动吸收谱带,1739 cm⁻¹强峰是C=O的伸缩振动吸收谱带,1521 cm⁻¹强峰是C=C伸缩振动吸收谱带,1332 cm⁻¹强峰是N-O伸缩振动吸收谱带,1244 cm⁻¹强峰是C-O伸缩振动吸收谱带。770 cm⁻¹中强峰是苯环邻位双取代特征吸收谱带。其中1332 cm⁻¹的强吸收峰是取代喹啉-1,4-二氧化物的特征吸收峰(图5-图6)。

图5 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯的红外光谱图

图6 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯的红外光谱图

2.4.2 质谱(MS) 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯[M]:最大质荷比 $m/z = 295.66$, 基峰 $m/z = 294.66$ 。确定该化合物分子量为 296, 分子式为 $C_{16}H_{12}O_4N_2$ 。

1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯[M]:最大质荷比 $m/z = 334.89$, 基峰 $m/z = 334.02$ 。确定该化合物分子量为 336, 分子式为 $C_{19}H_{16}O_4N_2$ (图7-图8)。

2.4.3 核磁共振谱(1H NMR) 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯 δ ppm: 8.72 ~ 8.56 (2H), 8.05 (2H), 7.45 (2H), 7.37 (2H), 7.05 (1H), 2.51 (3H)。

1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯 δ ppm: 8.62 ~ 8.56 (2H), 7.91 ~ 7.83 (2H), 7.33 ~ 7.25 (2H), 7.17 (2H), 6.95 (1H), 6.15 (2H), 4.05 ~ 3.87 (2H), 2.51 (3H)(图9-图10)。

图7 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯的质谱图

图10 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯的¹H NMR谱图

图8 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯的质谱

图9 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸苯酯的¹H NMR谱图

3 讨论与小结

1,4-二氧喹啉衍生物具有显著的抑菌活性,被广泛用作兽药进行研究。目前,国内围绕喹烯酮的制备方法、催化剂改进及喹烯酮衍生物方面的研究较多,如唐树和等^[16]报道了以碳酸钠作催化剂进行 Beirut 反应制备 3-甲基-2-乙酰基-1,4-二氧喹啉的合成工艺路线、戴述诚

等^[15]报道将催化剂甲醇钠改为盐类催化剂,对喹烯酮的合成工艺路线和合成方法进行了改进;但在其转型升级方面的研究较少,特别是结构创新方面的研究报道,如魏晓然等^[19]研究了 3-甲基-2-[3-(2-咪唑基)丙烯甲酰]-喹啉-1,4-二氧化物的合成较为少见。在保证安全有效的前提下,制备结构各具特色的喹烯酮衍生物的研究亟待加强。

为合成新喹烯酮衍生物,以苯并咪唑为原料,经 Beirut 反应和酯交换反应,分别将苯酚和肉桂醇引入 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸乙酯上,合成了两种喹烯酮酯。

在贝鲁特缩合反应中,在三乙胺的催化下苯并咪唑和乙酰乙酸乙酯反应,可以不用另加溶剂,乙酰乙酸乙酯既做反应物同时也是溶剂。实验过程中发现,用二乙胺作催化剂需冰水冷却,反应速度快,但会产生大量红褐色油状物,产率低;用三乙胺作催化剂,反应时间较长,但反应温和,产率高。每克苯并咪唑用 2 mL 三乙胺和 1.25 mL 乙酰乙酸乙酯时产率较高。与文献^[6]相比,乙酰乙酸乙酯的用量减少了 13%,三乙胺的用量减少了 72%,用甲醇替代丙酮进行重结晶,最终产率提高了 10%。

在酯交换反应中,试验中用易挥发的浓盐酸做催化剂,保持在溶剂乙醇微沸的条件下进行反应。由于酯交换平衡的影响,会使目的产物的产率较低,因此,在反应过程中采取减压蒸馏蒸出乙醇,从而提高目的产物的产率。反应得到的产物为红褐色粘稠状物质,加入乙酸乙酯后析出沉淀。但在合成 1,4-二氧喹啉-3-甲基-2-甲酸肉桂酯时出现了不沉淀的现象,试验发现,用超声分散 20 min 即可析出沉淀获得产物。

通过红外光谱、质谱和核磁共振谱鉴定证明了所得化合物系目标产物,说明该合成路径是合理有效的。同时,滤纸片抑菌试验说明了两种化合物对4种供试菌种均具有明显的抑菌活性。

参考文献:

- [1] Suter W, Rosselet A, Knüsel F. Mode of action of quinoxin and substituted quinoxaline - di - N - oxides on *Escherichia coli*. [J]. *Antimicrobial Agents & Chemotherapy*, 1978, 13(5): 770 - 783.
- [2] Beutin L, Preller E, Kowalski B. Mutagenicity of quinoxin, its metabolites, and two substituted quinoxaline - di - N - oxides. [J]. *Antimicrobial Agents & Chemotherapy*, 1981, 20(3): 336 - 343.
- [3] Ganley B, Chowdhury G, Bhansali J, *et al.* Redox - activated, hypoxia - selective DNA cleavage by quinoxaline 1, 4 - di - N - oxide. [J]. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 2001, 9(9): 2395 - 2401.
- [4] Carta A, Sanna P, Gherardini L, *et al.* Novel functionalized pyrido[2, 3 - g]quinoxalinones as antibacterial, antifungal and anticancer agents[J]. *Farmaco*, 2001, 56(12): 933 - 938.
- [5] 孔新刚. 新1,4 - 二氧喹啉类衍生物的合成、抑菌活性及与血清白蛋白相互作用的研究[D]. 新疆农业大学, 2008.
- [6] 张道凌, 梁剑平, 刘宇, 等. 喹啉1, 4 - 二氧化物的合成及抗菌活性[J]. *中国医药工业杂志*, 2008, 39(6): 410 - 412.
- [7] 马敬中, 占升卫, 胡超男, 等. 1, 4 - 二氧喹啉甲醛亚胺的合成和抑菌活性[J]. *应用化学*, 2006, 23(6): 637 - 640.
- [8] 孔新刚, 郭明, 毛胜凤, 等. 新化合物1, 4 - 二氧喹啉 - 3 - 甲醛缩氨基硫脲 - 2 - 甲酸乙酯的合成及抑菌活性[J]. *浙江农林大学学报*, 2008, 25(6): 685 - 688.
- [9] Yen J T, Nienaber J A, Pond W G, *et al.* Effect of carbadox on growth, fasting metabolism, thyroid function and gastrointestinal tract in young pigs. [J]. *Journal of Nutrition*, 1985, 115(8): 970 - 979.
- [10] 王道坤. 国家一类新兽药——喹烯酮[J]. *畜牧市场*, 2007, 12(1): 57 - 57.
- [11] Ferrando R, Truhaut R, Raynaud J P, *et al.* Toxicity by relay. III. Safety for the human consumer of the use of Carbadox, a feed additive for swine, as estimated by a 7 years relay toxicity on dogs [J]. *Toxicology*, 1978, 11(2): 167 - 183.
- [12] 朱柱振, 陈杖榴, 冯淇辉. 喹乙醇在鸡体内的药物动力学及组织浓度研究[J]. *畜牧兽医学报*, 1993(3): 258 - 264.
- [13] 曾英华, 方热军. 喹烯酮的研究及应用概况[J]. *湖南饲料*, 2010(6): 19 - 20.
- [14] 王旭, 程古月, 周秋格, 等. 兽用喹啉类毒理学研究进展[J]. *中国农学通报*, 2015(17): 16 - 21.
- [15] 戴述诚, 郭忠东, 易惠文. 喹烯酮合成方法的改进[J]. *中国兽药杂志*, 2005, 39(10): 42 - 43.
- [16] 唐树和, 唐树民, 孙松华. 喹烯酮合成工艺的改进[J]. *化学通报: 印刷版*, 2009, 72(4): 381 - 383.
- [17] 赵晓丽, 郑国钧. 喹烯酮合成方法的研究[J]. *兽药与饲料添加剂*, 2008, 13(3): 4 - 5.
- [18] 叶孟兆, 谢荣春, 徐伟亮. 2 - 乙酰基 - 3 - 甲基喹啉 - 1, 4 - 二氧化物的合成[J]. *浙江大学学报: 农业与生命科学版*, 1994(4): 427 - 430.
- [19] 魏晓然, 王琳, 罗星, 等. 3 - 甲基 - 2 - [3 - (2 - 咪喃基) 丙烯甲酰] - 喹啉 - 1, 4 - 二氧化物合成研究[J]. *中国兽药杂志*, 2015, 49(6): 17 - 22.

(编辑:陈希)