doi:10.11751/ISSN.1002-1280.2018.02.03

半滑舌鳎源美人鱼发光杆菌美人鱼亚种的分离鉴定

杨楠, 张志强, 吴同垒, 王洪彬, 史秋梅, 高桂生*

(河北科技师范学院, 河北秦皇岛 066604)

[收稿日期] 2017-06-12 [文献标识码] A [文章编号] 1002-1280 (2018) 02-0019-07 [中图分类号] S852.61

[摘要] 2016年5月河北省秦皇岛市昌黎县某海水养殖基地半滑舌鳎突发大批死亡,为了确定引起死亡的病原菌,无菌采集心血进行病原菌分离鉴定,16S rDNA 基因序列分析与 GenBank 中公布的美人鱼发光杆菌参考株序列同源率为 99.6%,被鉴定为美人鱼发光杆菌;进一步通过生化特性分析,被确认为美人鱼发光杆菌美人鱼亚种。动物回归试验结果表明,其对舌鳎鱼具有很强的致病性,其 LD₅₀ 为 3.1×10⁴ CFU/mL,且对哺乳动物具有致病性。药敏试验结果显示,分离菌对诺氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星,乙酰甲喹高度敏感;对多西环素、阿米卡星中敏感;对庆大霉素、头孢曲松、替米考星等不敏感。

[关键词] 半滑舌鳎;美人鱼发光杆菌美人鱼亚种;分离鉴定;药敏试验

Isolation and Identification of *Photobacterium damsela* subsp. *damsela* from Tongue Sole

YANG Nan, ZHANG Zhi-qiang, WU Tong-lei, WANG Hong-bin, SHI Qiu-mei, GAO Gui-sheng*

(Hebei Normal University of Science & Technology, Qinhuangdao, Hebei 066604, China)

Corresponding author: GAO Gui-sheng, E-mail: Ggs1964@163.com

Abstract: In May 2016, an epizootic occurred among cultured tongue sole caused mass deaths in a fish farm in Qinhuangdao, China. In order to find out etiologic agent, a strain of bacterium was isolated from the aseptically collecting ascites and other tissues of sick tongue sole. The isolate was identified as *Photobacterium damsela* subsp. *damsela* by isolation culture, Gram staining, physiological identification, morphological observation, biochemical identification and 16S rDNA sequence analysis. It is showed that the isolate shared 99.6% homology with reference strain in GenBank. The results of animal regression test showed that the isolate can pathogenic and the pathogenicity was relatively strong. The LD₅₀ of was 3.1×10⁴ CFU/mL, and pathogenicity to mammals. The results of the antibiotic resistance test showed the isolate was highly sensitive to Norfloxacin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Maquinox; was insensitive to Gentamicin, Ceftriaxone, Tilmicosin and so on, and it had different degrees to other drugs.

基金项目: 河北省科技厅奖励性后补助项目(15926620H);秦皇岛市科技局科技支撑计划(201401A067)

作者简介: 杨楠, 硕士研究生, 主要从事动物传染病学;张志强, 为共同第一作者。

通讯作者: 高桂生。E-mail: Ggs1964@163.com

Key words: tongue sole; *Photobacterium damsela* subsp. *damsela*; isolation and identification; antimicrobial susceptibility test

美人鱼发光杆菌 (*Photobacterium damsela*) 又称海弧菌, 是海洋革兰氏阴性球杆菌, 包括美人鱼亚种 (*Photobacterium damsela* subsp. *Damsela*; PDD) 和杀鱼亚种 (*Photobacterium damsela* subsp. *Piscicida*; PDP) 两个亚种, 在美国、日本、欧洲和我国的海水养殖中为常见的病原菌^[1-2]。该菌是嗜盐病原菌中的重要成员, 是一种机会致病菌, 广泛存在于海水及寄生于海产动物中, 没有明显的宿主特异性, 能够感染多种海洋经济鱼类, 造成大批死亡; 比如雀鲷科鱼^[3]、卵形鲳鲹^[4]、斑节对虾^[5]、鲱鱼^[6]等; 也有报道称, 该菌还能感染甲壳类、软体动物、爬行动物^[7]。在海洋哺乳动物中, 1988 年首次报道美人鱼发光杆菌美人鱼亚种从发病宽吻海豚体内分离^[6]。患病鱼临床表现为败血症, 体表溃疡, 腮部、鳍部出血, 断尾; 该菌发病迅速, 死亡率高, 给养殖业的造成重大经济损失。对人而言, PDD 是一种人鱼共患病病原菌, 机会性感染暴露于盐水或半咸水域和海洋活动过程中造成的伤口, 可能会演变为坏死性筋膜炎甚至致命^[8]。

2016 年 5 月, 秦皇岛市昌黎县某海水养殖基地, 大批舌鲷突然死亡, 死亡率高达 25%。病鱼食欲不振, 不喜活动, 脱离鱼群, 体表溃疡, 腮鳍部出血, 有的甚至断尾; 剖检可见肠道充血, 腹水严重, 肝脏肿胀充血, 肾脏微黄。研究从病鱼体内分离出优势菌株, 进行 PCR 鉴定、生化特性鉴定, 最终确定分离菌是美人鱼发光杆菌美人鱼亚种。

1 材 料

1.1 病料样品 河北秦皇岛市昌黎县某海水养殖基地病死舌鲷, 体重在 420~780 g 之间。

1.2 实验材料 普通营养琼脂培养基, 购自青岛高科园海博生物技术有限公司; 血琼脂平板 (兔血) 购自郑州安图生物工程股份有限公司; 药敏片, 购自杭州微生物试剂公司; 2×Es Taq MasterMix, 购自

康为世纪公司; 16S rDNA 所用引物, 均由北京生工生物工程有限公司合成; 克隆菌株 DH5α 为实验室保存; ATB 全自动生化鉴定系统, 由法国梅里埃公司生产; ID32E 鉴定试剂条购自北京威泰科生物技术有限公司。

1.3 实验动物 试验用舌鲷鱼购自某水产养殖基地, 体重约 200 g/尾; 清洁级 BALB/c 小鼠, 购自中国医学科学院实验动物研究所; 实验动物试验前均在实验室自由采食 1 周, 以适应环境。

2 方 法

2.1 细菌分离与鉴定

2.1.1 细菌的分离培养与镜检 无菌采集心血接种于营养琼脂上, 30 ℃ 培养 12 h, 平板上长出均一菌落, 挑取单菌落于血液琼脂上进行菌落形态和溶血性观察; 对分离菌株进行革兰氏染色镜检, 观察细菌染色特性及形态; 选取优势菌落接种于普通 LB 液体培养基中, 划线于两个兔血琼脂平板上, 分别置于 30 ℃ 和 37 ℃ 培养 12 h, 观察分离菌株是否于 37 ℃ 生长。

2.1.2 分离菌株的 16S rDNA 基因序列分析 抽提分离菌株基因组并以其为模板进行 PCR, 引物为 27F (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') 和 1492R (5'-GGTTACCTTGTACGACTT-3')。50 μL PCR 体系: 2×Taq PCR Mix 25 μL, 上游引物 1 μL, 下游引物 1 μL, ddH₂O 22 μL, 模板 1 μL。回收目的基因片段, 与 pMD18-T 连接后转入 DH5α 大肠杆菌感受态细胞; 挑单菌落 PCR 检测, 阳性菌株提取质粒并送测序。

测序结果经过拼接后, 在 NCBI 上 Blast 工作区上进行序列比对, 下载同源性高的菌株序列以及相关菌种的 16SrRNA 序列, 进行同源性分析、构建系统发育树。

2.1.3 生化鉴定 采用 ATB 自动生化鉴定系统:

将分离菌株接种鲜血琼脂培养基,刮取菌落接种生理盐水,调整菌液浓度至 0.5 个麦氏浊度,将菌液加入 ID32E 生化鉴定试纸条样品孔中,40 μL /孔,并在厌氧培养的孔中加入一滴矿物油,置于湿盒中,30 $^{\circ}\text{C}$ 培养 24 h;次日在吡啶实验孔加入一滴 James 染液,将试纸条置于 ATB 自动鉴定系统中进行鉴定。

2.2 药敏试验 按照美国临床检验标准委员会(NCCLS)推荐的标准 K-B 纸片法进行试验操作和结果判断。

2.3 动物致病性试验及分离菌 LD_{50} 检测

2.3.1 动物致病性试验 将纯培养分离菌接种于 LB 培养基 30 $^{\circ}\text{C}$ 培养 10 h,用生理盐水洗涤,调整菌液为 1.0×10^8 CFU/mL。选取 12 只健康舌鳎鱼,随机分成 3 组,2 个实验组,1 个对照组,每组 4 尾。实验组每尾腹腔注射 0.2 mL 菌液,对照组注射 0.2 mL 生理盐水,连续观察 4 d,记录试验舌鳎鱼发病死亡情况,并对病死鱼进行细菌分离鉴定。

2.3.2 分离菌对舌鳎鱼的 LD_{50} 检测 选取健康舌鳎鱼 60 尾,随机分成 6 组,5 组为实验组,1 组为对照组,每组 10 尾。用灭菌生理盐水稀释菌液至 1.0×10^6 、 1.0×10^5 、 1.0×10^4 、 1.0×10^3 、 1.0×10^2 CFU/mL 五个实验梯度,实验组每尾腹腔注射 0.2 mL 菌液,对照组每尾腹腔注射等体积的生理盐水。攻毒后 72 h 观察患病及死亡情况,用寇氏改良法计算 LD_{50} ,并对病死鱼进行剖检、细菌分离鉴定。

2.3.3 分离菌对 BALB/c 小鼠的 LD_{50} 检测 选取健康 BALB/c 小鼠 60 只,分组处理同 2.3.2。用灭菌生理盐水稀释菌液至 1.0×10^8 、 1.0×10^7 、 1.0×10^6 、 1.0×10^5 、 1.0×10^4 CFU/mL 五个实验梯度,实验组小鼠腹腔注射 0.1 mL 菌液,对照组注射等体积生理盐水;其余操作同 2.3.2。

3 结果

3.1 细菌分离与鉴定

3.1.1 细菌分离培养与镜检 从半滑舌鳎中分离出一株细菌,在兔血平板长出半透明,圆形光滑、中

间较隆起、边缘整齐中等大小菌落,呈现典型的 β 型溶血(图 1),为革兰氏染色阴性的球杆菌(图 2)。

图 1 分离菌血琼脂培养

Fig 1 Blood agar medium

图 2 分离菌革兰氏染色镜检结果

Fig 2 Gram staining

3.1.2 分离菌株的 16S rDNA 基因序列分析 以抽提分离菌株基因组为模板,16S rDNA 引物进行 PCR 扩增,产物经琼脂糖凝胶电泳,于 1500 bp(图 3) 出现目的条带。分离菌株 16S rDNA 基因序列与 GenBank 上公布的美人鱼发光杆菌参考株高度同源,证实其为美人鱼发光杆菌。利用 Lasergene 软件上的 MegAlign 分区对分离菌与美人鱼发光杆菌标准株 ATCC33539、CECT5064 等参考菌株进行序列比对。结果显示(图 4、图 5),分离菌株与美人鱼发光杆菌处于同一分支,进一步说明分离菌株为美人鱼发光杆菌。

M:DNA 标准 DL2000;1:从心血中分离菌的 16S rDNA 扩增产物

M:DL2000 Marke;1:PCR products of positive strains from the heart blood

图 3 分离菌 16S rDNA PCR 扩增产物

Fig 3 PCR result of 16S r DNA gene from Isolated bacteria

		Percent Identity									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Divergence	1	■	99.6	99.6	99.6	98.1	93.7	95.5	91.3	1	phdd isolate.seq
	2	0.4	■	100.0	100.0	98.4	94.0	95.6	90.1	2	Phdp strain ATCC 33539.seq
	3	0.4	0.0	■	100.0	98.4	94.0	95.6	91.6	3	Phdd strain CECT5064.seq
	4	0.4	0.0	0.0	■	98.4	94.0	95.6	91.6	4	Phdd strain H29040401H.seq
	5	1.9	1.6	1.6	1.6	■	93.2	94.9	90.3	5	V.parahaemolyticus strain CAPL_B_05.seq
	6	6.6	6.3	6.3	6.3	7.1	■	95.2	90.0	6	V.salmonicida isolate PB1-8rrnB.seq
	7	4.7	4.5	4.5	4.5	5.3	4.9	■	91.8	7	V.vulnificus strain ATCC 27562.seq
	8	9.2	10.6	8.9	8.9	10.4	10.8	8.7	■	8	E.tarda ATCC 15947.seq
	1	2	3	4	5	6	7	8			

图 4 分离菌株 16S rDNA 同源性比较

Fig 4 Homology comparison of nucleotide sequences of 16 S rDNA gene

图 5 分离菌株 16S rDNA 基因序列的系统发育树

Fig 5 Phylogenetic analysis based on sequences 16 S rDNA gene

3.1.3 分离菌生化鉴定结果 对分离菌株进行生化特性鉴定证实其为美人鱼发光杆菌,进一步检测

分离菌株七叶苷发酵阳性,37℃ 生长良好,证实其为美人鱼亚种。

表 1 分离菌株主要生化指标

Tab 1 Main phenotypic traits of the isolate

生化项目	结果	生化项目	结果
d-葡萄糖 GLU	+	5 酮基葡萄糖酸盐 5KG	-
脂酶 LIP	+	赖氨酸脱羧酶 LDC	+
L-阿拉伯醇 LARL	-	L-阿拉伯糖 LARA	-
d-甘露醇 MAN	-	吡啶 IND	-
丙二酸盐 MNT	-	d-半乳糖酸盐同化 GAT	-
D-阿拉伯醇 DARL	-	d-纤维二糖 CEL	-
L 天冬氨酸方胺酶 AspA	+	侧金盏花醇 ADO	-
精氨酸双水解酶 ADH	+	肌醇 INO	-
d-海藻糖 TRE	+	β-葡萄糖醛缩酶 β-GAL	-
β-葡萄糖苷酶 β GLU	+	β-半乳糖苷酶 β-GAL	+
α-麦芽糖 α MAL	-	α-葡萄糖苷酶 α GLU	+
d-麦芽糖 MAL	+	尿素酶 URE	-
β N 乙酰葡萄糖胺 β NAG	+	d-山梨醇 SOR	-
蔗糖 SAC	-	酚红 RP	+
α-半乳糖苷酶 αGAL	-	古老糖 PLE	-
L-鼠李糖	-	鸟氨酸脱羧酶 ODC	-
七叶苷	+	37 ℃ 生长	+

“+”表示阳性;“-”表示阴性。

"+" positive; "-" negative.

3.2 药敏试验 药敏试验共计使用 21 种药物,结果显示,分离菌对恩诺沙星、诺氟沙星、环丙沙星、乙酰甲喹敏感;对头孢拉定、多西环素中敏;对大观霉素、庆大霉素、林可霉素、二甲氧嘧啶、新诺明、替米考星、间甲氧嘧啶、青霉素、链霉素、土霉素、氨基青霉素、新霉素、头孢曲松、卡那霉素、阿米卡星不敏感。

3.3 分离菌动物回归试验及 LD₅₀ 检测

3.3.1 分离菌动物回归试验 实验组舌鳎鱼在接种分离菌 12 h 后出现死亡,36 h 全部死亡;对照组无死亡。实验组舌鳎鱼腮部有出血症状,剖检发现肝脏肿胀,肠粘膜出血,这与最初分离菌的症状相符。从死亡舌鳎鱼内脏分离细菌培养,按照上述方

法镜检、PCR 试验、生化鉴定,确定该病菌与养殖场病死舌鳎鱼体内分离的细菌一致,均为美人鱼发光杆菌。

3.3.2 分离菌对舌鳎鱼的 LD₅₀ 检测 5 个试验梯度中,第 1 组舌鳎鱼在攻毒 16 h 后出现死亡,第 1、2 组舌鳎鱼 48 h 内全部死亡,连续观察一周,第 5 组和对照组无死亡。根据表 2 数据,利用寇氏改良法计算出 PDD 对舌鳎鱼的 LD₅₀ = 3.1×10⁴ CFU/mL。

3.3.3 分离菌对 BALB/c 小鼠的 LD₅₀ 检测 实验 1 组小鼠在接种病菌 5 h 后出现死亡,实验 1、2 组小鼠在 16 h 内全部死亡;对照组没有死亡,连续观察一周。根据表 3 数据,利用寇氏改良法计算出 PDD 对 BALB/c 小鼠的 LD₅₀ = 5.0×10⁵ CFU/mL。

表 2 分离菌半数致死量检测结果

Tab 2 Median lethal dose of isolated bacteria

组别 Group	实验动物/尾 laboratory animals	浓度/(CFU · mL ⁻¹) concentration	剂量/mL dose	死亡数量/尾 Number of death	死亡率/% mortality
1	10	1×10 ⁶	0.2	10	100%
2	10	1×10 ⁵	0.2	10	100%
3	10	1×10 ⁴	0.2	7	70%
4	10	1×10 ³	0.2	3	30%
5	10	1×10 ²	0.2	0	0%
6	10	0	0.2	0	0%

表 3 分离菌半数致死量检测结果

Tab 3 Median lethal dose of isolated bacteria

组别 Group	实验动物/只 laboratory animals	浓度/(CFU · mL ⁻¹) concentration	剂量/mL dose	死亡数量/只 Number of death	死亡率/% mortality
1	10	1×10 ⁸	0.1	10	100%
2	10	1×10 ⁷	0.1	10	100%
3	10	1×10 ⁶	0.1	8	80%
4	10	1×10 ⁵	0.1	2	0%
5	10	1×10 ⁴	0.1	0	0%
6	10	0	0.1	0	0%

4 讨论与小结

美人鱼发光杆菌包含美人鱼杀鱼亚种和美人鱼亚种两个亚种,其中美人鱼亚种以前被称为美人鱼弧菌,具有某些弧菌特性,研究发现美人鱼亚种细菌条件致病,感染宿主范围广泛,能够感染多种鱼类,亦可感染包括人在内的哺乳动物,具有一定的公共卫生学意义。PDD 感染鱼类主要引起细菌性败血症,死亡率较高。研究 PDD 分离自秦皇岛某养殖基地病死舌鳎内脏,病鱼外观表现与病理变化与 PDD 感染相似。

美人鱼发光杆菌美人鱼亚种最早从患有皮肤溃烂病的雀鲷鱼^[3]中发现,此后陆续从大菱鲆、海鲤、石斑鱼、鲨鱼以中分离得到^[9],但从半滑舌鳎鱼种分离该菌尚属首次。PDD 感染致病的资料较少,对于其致病的报道多集中于国外,但其造成危害较大,尤其近年来该菌所致感染在我国呈上升趋势,实验室已多次从冀东沿海地区分离出该菌,应重视其潜在威胁。除此之外,对美人鱼发光杆菌美人鱼

亚种进行研究的意义在于其具有的公共卫生学价值,PDD 能够感染人已被证实,食源性途径和伤口是人类感染的主要方式^[10]。研究中所分离的菌株能够在 37℃ 生长良好,同时对舌鳎鱼和小鼠均具有较强的致病性(半数致死量分别为 3.1×10⁴ CFU/mL 和 5.0×10⁵ CFU/mL),揭示了其对人类健康的潜在威胁。

目前,对于水产细菌病原的防治多以抗生素和化学药物为主,其能够对细菌性病原有一定的治疗效果,但其所造成的抗生素残留、水体污染以及诱导细菌多重耐药情况不容忽视。对江苏沿海地区水体细菌进行耐药情况调查结果表明,江苏省沿海地区分离的部分水产养殖致病菌出现多重耐药,二重、三重、四重、五重耐药率分别为 22.3%、13.5%、10.9%、6.6%,某些菌株甚至达到十一重耐药^[11];上海地区分离菌株多重耐药率为 100%,海南地区分离菌株多重耐药率为 77.5%^[12]。由此可见,海水弧菌的多重耐药现象严重,各地区病原菌所耐药物并

不一致,存在地区差异。在水产上耐药严重的病原菌有嗜水气单胞菌、温和气单胞菌^[13]、爱德华氏菌等^[14],其多重耐药的情况已引起人们重视。若抗生素继续不科学、不合理使用,可能会使耐药菌演变为超级细菌,给水产养殖业和人类健康构成巨大威胁。通过长期对冀东地区水产病原进行监测,所分离的部分菌株亦呈现明显的多重耐药情况。对研究分离的美人鱼发光杆菌美人鱼亚种进行药敏试验结果显示,分离菌株对多种抗生素不敏感,反映出本地水产细菌耐药形势严峻,可进一步检测分离菌株的耐药基因,为该病的防控提供参考。

参考文献:

- [1] 房海. 水产养殖动物病原细菌学[M]. 中国农业出版社, 2010.
Fang H. Aquacultural Animal Pathogenic Bacteriology [M]. China Agricultural university Press, 2010.
- [2] 王庚申, 许文军, 谢建军, 等. 条石鲷(*Oplegnathus fasciatus*) 源美人鱼发光杆菌杀鱼亚种(*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) 的分离鉴定[J]. 渔业科学进展, 2017, 38(2):151-157.
Wang G S, Xu W J, Xie J J, et al. Isolation and Identification of *Photobacterium damsela* subsp. *piscicida* from Diseased Rock Bream (*Oplegnathus fasciatus*) [J]. Progress in fishery Sciences, 2017, 38(2):151-157.
- [3] 张飞. 大黄鱼源美人鱼发光杆菌的分离鉴定与致病性研究[D]. 集美大学, 2013.
Zhang F. Studies on the identification and virulence of *Photobacterium damsela* isolated from *Pseudosciaen crocea* [D]. JiMei University, 2013.
- [4] 苏友禄, 冯娟, 郭志勋, 等. 美人鱼发光杆菌杀鱼亚种感染卵形鲳鲹的病理学观察[J]. 海洋科学, 2012, 36(2):75-81.
Su Y L, Feng J, Guo Z X, et al. Histopathological analysis of golden pompano *Trachinotus ovatus* infected with *Photobacterium damsela* subsp. *piscicida* [J]. Marine Sciences, 2012, 36(2):75-81.
- [5] 兰萍, 宋晓玲, 张辉, 等. 美人鱼发光杆菌对凡纳滨对虾非特异性免疫功能及抗病力的影响[J]. 渔业科学进展, 2010, 31(1):65-7.
Lan P, Song X L, Zhang H, et al. Effect of *Photobacterium damsela* on the non-specific immune response and disease resistance of *Litopenaeus vannamei* [J]. Progress in fishery Sciences, 2010, 31(1):65-7.
- [6] Yashgin H, Nima B, Majid B S. First time isolation of *Photobacterium damsela* subsp. *damsela* from *Caranx sexfasciatus* Persian Gulf, Iran [J]. Iranian Journal of Microbiology, 2015, 7(3):178-184.
- [7] Terceti M S, Rivas A J, Alvarez L, et al. RstB regulates expression of the *Photobacterium damsela* subsp. *damsela* major virulence factors damselysin, phobalysin P and phobalysin C. [J]. Frontiers in Microbiology, 2017, 8
- [8] Takahashi H, Miya S, Kimura B, et al. Difference of genotypic and phenotypic characteristics and pathogenicity potential of *Photobacterium damsela*, subsp. *damsela*, between clinical and environmental isolates from Japan [J]. Microb Pathog, 2008, 45(2):150-158.
- [9] Terceti M S, Ogut H, Osorio C R. *Photobacterium damsela* subsp. *damsela*, an emerging fish pathogen in the Black Sea: evidences of a multiclonal origin [J]. Applied & Environmental Microbiology, 2016, 82(13):AEM.00781-16.
- [10] Thune R L, Fernandez D H, Hawke J P, et al. Construction of a safe, stable, efficacious vaccine against *Photobacterium damsela* ssp. *piscicida* [J]. Diseases of Aquatic Organisms, 2003, 57(1-2):51.
- [11] 乔毅. 江苏省沿海地区水产养殖主要致病菌耐药性研究[D]. 上海海洋大学, 2015.
Qiao Y. Study on the major pathogenic bacteria resistance of aquaculture in the coastal regions of Jiangsu province [D]. Shanghai Ocean University, 2015.
- [12] 写腊月. 海水弧菌耐药性调查及整合子-基因盒系统检测[D]. 上海海洋大学, 2012.
Xie L Y. Survey of antimicrobial resistance and detection of integron gene cassettes of *Vibrio* isolates from mariculture [D]. Shanghai Ocean University, 2012.
- [13] 谭爱萍. 水产动物源气单胞菌耐药性与质粒介导喹诺酮类耐药研究[D]. 华南农业大学, 2016.
Tan A P. Surveillance of antimicrobial resistance and study of plasmid-mediated quinolone resistance among aeromonas isolates from different aquatic animals [D]. South China Agricultural University, 2016.
- [14] 葛慕潮, 靳晓敏, 张艳英, 等. 迟钝爱德华氏菌耐药表型及 4 种耐药基因检测[J]. 水产科学, 2015, 34(5):300-304.
Ge M X, Jin X M, Zhang Y Y, et al. Detection of drug resistance and four drug resistance genes in bacterial pathogen *Edwardsiella tarda* [J]. Fisheries science, 2015, 34(5):300-304.

(编辑:陈希)